

# خبر دار

سفارش کردہ ادویات کا استعمال اور خرید و  
فروخت کرنے سے پہلے ادویات کی رجسٹریشن اور  
لیبل کلیم برائے سبب از طرف سینٹرل انسکٹیسائیٹس  
بورڈ اور آر۔ سی بھارت سرکار ہونا لازمی ہے ورنہ  
ادویات کو جعلی تصور کیا جائے گا۔

## انتباہ

☆ یہ شیڈول وادی کشمیر کے سازگار موسمی حالات کے لئے موزوں ہے۔

☆ ناسازگار موسمی حالات کے پیش نظر متعلقہ ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر یا نزدیکی کرشی وگیان کیندر کے سائنسدانوں سے رابطہ قائم کر کے صلاح لیں۔

☆ اس شیڈول کو موثر بنانے کے لئے اپنے اور پاس پڑوس کے باغوں کی صفائی کو ہر صورت میں یقینی بنائیں۔ فرش پر پڑے پتوں اور شاخ تراشی کے دوران گرمی ہوئی شاخوں کو فی الفور ضائع کریں۔

ادویات اور  
ان کا شرح استعمال  
ادویات کی دکھائی گئی  
مقدار فی ایک سو لیٹر (100  
Litres) پانی میں استعمال کریں۔

## پہلی دوا پاشی

(تاخیر خوابیدہ مرحلہ)

ہارٹیکلچر منیرل آئیل کے دو لیٹرنی سویلٹر پانی میں  
ملا کر چھڑکاؤ کریں۔

☆ تاخیر خوابیدہ گرین ٹپ (ہرے پن) سے تجاوز  
نہیں کرنا چاہئے۔

درج ذیل منیرل آئیل میں سے کسی ایک کا انتخاب  
کر کے چھڑکاؤ کریں۔

میک ایچ ایم او، یا ایچ پی ٹری سپرے آئیل، یا  
سروو، یا آرچل-۱۳، یا آرچل-ٹی ایس او، یا  
ایربوفائن ایکسٹرای، یا پیٹروسٹار، یا ایسٹرو سپرے  
آئیل، یا ڈیورائیک، یا ویڈال ٹری سپرے آئیل،  
یا بال سپرے ایچ ایم او، یا سپیکال-او ایس او-ایچ  
ایم او، یا ریلسو-۹۹۹

## دوسری دوا پاشی

(سبز رنگت اختیار کرنے پر)

پھپھوند کش ادویات اور ان کی مقدار

مینکو زیب (75WP)، 300 گرام،

یا پروپنٹ (70WP)، 300 گرام، یا زائیب

(75WP) 300 گرام، یا کپتان (50WP)

300 گرام۔

\* کپتان کا چھڑکاؤ کرنے کی صورت میں ہارٹیکلچر

منیرل آئیل اور کپتان کے چھڑکاؤ میں کم سے کم دس دن کا

وقفہ رکھنا لازمی ہے۔

\*\* بارشیں ہونے کی صورت میں کیمیائی

ادویات کے ساتھ اسٹیکرس کا استعمال ضرور کریں۔

## تیسری دوا پاشی

(گلابی رنگت اختیار کرنے پر)

(مرحلہ الف) دس سے چودہ دن دوسری دوا پاشی کے بعد

مینکو زیب (75WP)، 300 گرام، یا

پروپیٹب (70WP)، 300 گرام، یا کپتینان

(50WP)، 300 گرام، یا زائرام (80WP)،

200 گرام، یا \* ڈوڈین (65WP)، 60 گرام،

یا \* زائیب +68% ہیکسا کونازول (72WP)

4%، 100 گرام۔

\* سبزرنگت پر مسلسل بارشوں کی وجہ سے خلل پڑنے

کی صورت میں ان ادویات کے چھڑکاؤ کو ترجیح دیں۔

\*\* ڈوڈین کے بغیر دیگر کیمیائی ادویات کے ساتھ

اسٹیکرس کا استعمال ضرور کریں۔

(مرحلہ ب)

(حسب ضرورت)

3 سے 4 دن کے وقفہ کے بعد خالص کیڑے مار:

I۔ کیڑے مار ادویات اس وقت کریں جب ایچ ایم اوکا  
چھڑکا کسی وجہ سے کرنے سے رہ گیا ہو۔

ڈائی میتھوائٹ (30EC)، 100 ملی لیٹر۔

II۔ کیڑے مار و مائٹ کش ادویات اس وقت کریں

جب ایک پھول میں دو یا دو سے زیادہ تھرپس دکھائی دیں۔

تھیوکلوپرائڈ (21.7 SC) ، 40 ملی لیٹر۔

## چوتھی دوا پاشی

(60-70 فیصد پنکھڑیاں گرنے پر)

(مرحلہ الف) 12 سے 15 دن تیسری دوا پاشی کے بعد

ڈائیٹینا کونازول (25EC)، 30 ملی لیٹر، یا

فلوسیلازول (40EC)، 20 ملی لیٹر، یا

ٹرانفلاکسی سٹروبن 25% + ٹیپو کونازول 50%

(75WG)، 40 گرام۔

(حسب ضرورت)

(مرحلہ ب)۔

3 سے 4 دن کے وقفہ کے بعد

☆ کیڑے مار:- ڈائی میتھیونٹ (30EC)، 100

ملی لیٹر، یا کونٹل فاس (25EC)، 100 ملی لیٹر۔

☆☆ مائیٹ کش:- ہیکسی تھیازاکس (5.45EC)،

40 ملی لیٹر، یا فینزاکوئن (10EC)، 40 ملی لیٹر، یا



سپارٹو میسی فن (22.9SC)، 40 ملی لیٹر۔  
☆ جب سٹوز سکیل، کرائرس کی نشاندہی چھ سے بارہ فی  
مربع سینٹی میٹر ہو جائیں۔  
☆☆☆ جب ماسٹوں کی تعداد فی پتہ ۴ سے ۵ ہو جائے۔

## پانچویں دوا پاشی

(میوہ مٹردانے کے برابر ہونے پر)

(مرحلہ الف) 10 سے 14 دن چوتھی دوا پاشی کے بعد

مینکوزیب (75WP)، 300 گرام، یا

پروپییب (70WP)، 300 گرام، یا زائیب

(75WP)، (300 گرام)، یا کپتان

(50WP)، 300 گرام، یا زائرام (80WP)،

200 گرام۔

(مرحلہ ب)

کیڑے مار ادویات کا استعمال اور ان کی مقدار

3 سے 4 دن (مرحلہ الف) کی پانچویں دوا پاشی کے بعد

ا۔ کیڑے مار:- کلوروپیری فاس (20EC)، 100

ملی لیٹر، یا ڈائی مٹھیوٹ (30EC) ، 100 ملی لیٹر،  
☆ مائیٹ کش:- ہیکسی تھیازاکس (5.45EC) ،  
40 ملی لیٹر ، یا سپارومبسی فن (22.9SC) ، 40  
ملی لیٹر  
☆ حسب ضرورت مائیٹ کش دوا پاشی اس وقت  
کریں جب مائٹوں کی تعداد فی پتہ 5 سے زائد ہو جائیں۔

## چھٹی دوا پاشی

(میوہ بنتے ہوئے۔ مرحلہ -1)

(مرحلہ الف) 12 سے 15 دن پانچویں دوا پاشی کے بعد

ڈوڈین (65WP)، 60 گرام، یا ڈائیٹینا

کونازول (25EC)، 30 ملی لیٹر، یا زائنب 68% +

ہیکسا کونازول 4% (72WP)، 100 گرام۔

(حسب ضرورت)

(مرحلہ ب) 3 سے 4 دن کے وقفہ کے بعد

(1) کیڑے مار: کلوروپیری فاس (20EC)، 100

ملی لیٹر، یا کوئیل فاس (25EC)، 100 ملی لیٹر۔

(2) مائیٹ گش: ہیکسی تھیازاکس (5.45EC)، 40

ملی لیٹر، یا سپارو بیسی فین (22.9SC)، 40 ملی لیٹر۔

کیڑے مارا دویات کا استعمال اس صورت میں  
کریں جب بارک بیٹل یا جون بیٹل (Beetles) باغ  
میں دکھائی دیں یا روشنی پھندے میں پکڑی جائیں۔  
۲۔ مائیٹ گش ادویات کا استعمال اسی صورت میں  
کریں جب مائٹوں کی تعداد فی پتہ (۱۰) سے زائد  
ہو جائے۔

## ساتویں دوا پاشی

(میوہ بنتے ہوئے۔ مرحلہ۔ II)

(مرحلہ الف)

12 سے 15 دن چھٹی دوا پاشی کے بعد

فلوسیلازول (40EC)، 20 ملی لیٹر، یا میٹی رام

55% + پائراکلو سٹرابن 5% (60WG)، 100

گرام، یا مائیکو بیوٹائل (10WP)، 50 گرام۔

(مرحلہ ب) 3 سے 4 دن کے وقفہ کے بعد

کیڑے مار:-

ڈائی میتھویٹ (30EC)، 100 ملی لیٹر، یا

کلورپری فاس (20EC)، 100 ملی لیٹر۔

مانیٹ گش :-

ہیکسی تھیازاکس (5.45EC) ، 40 ملی لیٹر، یا

فینزاکوئین (10EC) ، 40 ملی لیٹر، یا

سپاروئیس فین (22.9SC) ، 40 ملی لیٹر، یا

سمرسپرے آئیل 750 ملی لیٹر۔

## آٹھویں دوا پاشی

(میوہ بنتے ہوئے۔ مرحلہ۔ III)

(مرحلہ الف) 12 سے 15 دن ساتویں دوا پاشی کے بعد

مینکوزیب (75WP)، 300 گرام، یا

زائرام (27SC)، 600 ملی لیٹر، یا

زائیب (75WP)، 300 گرام، یا زائرام

(80WP)، 200 گرام، یا کلوروتھیلونیل

(75WP)، 150 گرام۔

ساتویں دوا پاشی پر مسلسل بارشوں کی وجہ سے خلل پڑنے

پر درج ذیل ادویات کو ترجیح دیں۔

ڈانفینا کونازول (25EC)، 30 ملی لیٹر، یا

ٹرانفلاکسی سٹرابین +25% ٹیبیکونازول (75WG)

40، 50% گرام



(مرحلہ ب) (حسب ضرورت)

3 سے 4 دن کے وقفہ کے بعد

۱) کیڑے مار:- ڈائی میتھو ایٹ (30EC)، 100 ملی لیٹر، یا کلورپری فاس (20EC)، 100 ملی لیٹر۔  
۲) مائیٹ گش:- فینزا کوئن (10EC)، 40 ملی لیٹر، یا سپاروٹیسی فن (22.9SC)، 40 ملی لیٹر۔

۱:- کیڑے مار ادویات کا استعمال اس وقت کریں جب سنجوز سکیل کے رینگتے بچے تیرہ فی مربع سینٹی میٹر سے زائد ہو جائیں یا وولی اپیل افیڈس کی کالونیاں اوپری شاخوں پر دیکھی جائیں۔

۲- مائیٹ گش ادویات کا استعمال اس صورت میں کریں جب مائیٹوں کی تعداد فی پتہ دس (۱۰) سے زائد ہو جائیں۔

## نویں دوا پاشی

(میوہ بننے ہوئے۔ مرحلہ۔ IV)

\* (حسب ضرورت)

12 سے 18 دن آٹھویں دوا پاشی کے بعد

\* حسب ضرورت دوا پاشی اس وقت کریں جب پتوں پر

بیماری کے داغ %20 سے زیادہ ہوں۔

میٹی رام %55 + پائراکلو سٹرابن %5 (60WG)،

یا 100 گرام،

زائنب %68 + ہیکسا کونازول %4

(72WP)، 100 گرام، یا ہیکسا کونازول

(5EC)، 50 ملی لیٹر، یا مائلکو بیوٹائل (10WP)،

50 گرام۔

مارسونینا، سوئی بلاچ وفلائی سپیک جیسی بیماریاں

نمودار ہونے پر

مینکو زیب (75WP)، 300 گرام، یا

زائرام (27SC) ، 600 ملی لیٹر، یا پروپیٹ

(70WP)، 300 گرام، یا زائرام (80WP) ،

200 گرام۔

## دسویں دوا پاشی

☆ (حسب ضرورت)

کم سے کم 25 دن میوہ اتارنے سے پہلے

(مرحلہ الف)

مینکو زیب (75WP) ، 300 گرام ، یا

زلینب (75WP) ، 300 گرام ، یا زانرام

(80WP) ، 200 گرام ، یا کپتان (50WP) ،

300 گرام۔

☆ حسب ضرورت دوا پاشی اس وقت کریں جب میوہ

زیادہ دیر تک ذخیرہ کرنا ہو۔

## گیارویں دوا پاشی

(حسب ضرورت) فصل اُتارنے کے بعد

☆ کیڑے مار:-

کلوروپیری فاس (20EC)، 100 ملی لیٹر۔

☆ حسب ضرورت کیڑے مار ادویات کا استعمال اس

وقت کریں جب سبوز اسکیل کے ریگتے بچے فی مربع سینٹی

میٹر 13 سے زیادہ ہو جائیں یا وولی اپیل افیڈ کی کالونیاں

درخت کے اوپری شاخوں پر نمودار ہو جائیں۔

☆☆ مائیٹ کش ادویات:-

فینزا کوئین (10EC)، 40 ملی لیٹر۔

☆☆ حسب ضرورت مائیٹ کش ادویات کا استعمال

اس وقت کریں جب اگست کے آخری ایام میں مائیٹوں کی

تعداد فی پتہ بیس (۲۰) یا اس سے زیادہ ہو جائیں۔

## احتیاطی تدابیر

- ۱۔ پھپھوند کش اور کیڑے مار ادویات کے چھڑکاؤ کے درمیان تین سے چار دن کا وقفہ لازمی رکھیں۔
- ۲۔ پھپھوند کش اور کیڑے مار ادویات کو آپس میں ملانے سے گریز کرنا چاہئے۔
- ۳۔ ادویات کی ترتیب کی سفارش ہر مرحلے پر عام طور سے قیمتوں میں اضافے کے مطابق دکھائی گئی ہے۔
- ۴۔ ادویات کو زیادہ موثر بنانے کے لئے ایڈجوٹس اسٹکرز کا استعمال کریں، خاص کر بارش کے وقت سٹکرز جیسے سنڈووئیٹ بحساب 50 سے 75 ملی لیٹر سویلٹر سالیوشن میں ملا کر استعمال کریں۔
- ۵۔ ڈوڈین کے ساتھ سٹکرز کا استعمال نہ کریں۔
- ۶۔ درخت کے تنے کے ارد گرد 60 سنٹی میٹر زمین کی

- گڈائی نہ کریں اور نہ ہی اس کے ساتھ چھیڑنا چاہئے۔
- ۷۔ پھول کھلنے پر کیڑے مار ادویات کا استعمال ہرگز نہ کریں۔
- ۸۔ تمام کیڑے مار پھوندکش ادویات فصل اُتارنے کے تین یا چار ہفتے پہلے چھڑکنے چاہئے۔
- ۹۔ ایک ہی قسم کے کیڑے مار یا پھوندکش ادویات مسلسل دو دو پاشیوں کے لئے استعمال نہیں کرنے چاہئے۔
- ۱۰۔ باغ کی صفائی کے لئے گرے ہوئے پتے، تراش شدہ یا بیمار شدہ شاخیں اور گرے ہوئے و بیمار شدہ میوہ جات جلا کر ضائع کرنے چاہئے۔
- ۱۱۔ متوازن اور مکمل اجزاء کھاد کا استعمال کریں۔
- ۱۲۔ خشک سالی کی حالت میں جب میوہ مٹردانے کے برابر

ہو تو کیلشیم کلورائیڈ (ڈی ہینڈ ریٹڈ %0.3-0.5) بحساب 300 سے 500 گرام اور بورک ایسڈ (%0.15), 150 گرام فی صد لیٹر پانی میں ملا کر دو سے تین بار پہلی پھپھوند گش دوا پاشی (وسط اپریل سے اختتام اپریل) کے بعد 10 سے 15 دن کے وقفے کے بعد چھڑکاؤ کریں۔

۱۳۔ وقتاً فوقتاً گٹھنے کی اونچائی سے زائد گھاس پھوس جو پودے کے ارد گرد 60 سنٹی میٹر کے دائرے میں آتا ہے کاٹ کر ضائع کرنا لازمی ہے۔

۱۴۔ درجہ حرارت میں شدت اور بارش کے موسم میں دوا پاشی سے گریز کریں اور پودوں کو ادویات کے مضر اثرات سے بچانے کے لئے صبح یا شام کے وقت چھڑکاؤ کریں۔



۱۵۔ چھید کرنے والے کیڑوں سے اثر زدہ اور بیمار ٹہنیوں کو کاٹنا چاہئے اور انہیں ساتھ ہی جلا کر ضائع کرنا چاہئے۔

۱۶۔ محکمہ کے فیلڈ عملے کے ساتھ نزدیکی رابطہ رکھیں تاکہ بیماریوں کو مؤثر طریقے سے قابو میں رکھنے کے لئے کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کو مشاہدے میں رکھا جاسکے تاکہ دوائیوں کا صحیح اور بروقت استعمال ہو سکے۔

۱۷۔ ہارٹی کلچر مینرل آئیل (ایچ ایم او) کو سلفر یا سلفر سے بنے ہوئے پھپھوند کش کیڑے مار ادویات کے ساتھ ملانے سے گریز کریں۔ ورنہ پودے اور میوے کے لئے ضرر رساں ثابت ہو سکتا ہے۔

۱۸۔ ایچ ایم او سمر سپرے خشک سالی یا سخت دھند کے دوران

نہیں چھڑکنا چاہئے۔

۱۹۔ دوپاشی کے فوراً بعد بارش ہونے اور اسٹکر ز اور ایڈ جوئٹس کا استعمال نہ کرنے کی صورت میں ادویات کا چھڑکاؤ دہرانا چاہئے۔

۲۰۔ مکھیوں کے بچاؤ اور حفاظت کرنے کے لئے ادویات کا چھڑکاؤ صبح اور شام کے اوقات میں ہی عمل میں لانا چاہئے۔

۲۱۔ مکھیوں کے چھت چھڑکاؤ کے دوران باغات سے باہر رکھنا یقینی بنائیں۔

۲۲۔ مکھیوں کا پالنے کرنے والے مالکان کو ادویات کا چھڑکاؤ کرنے سے پہلے مطلع کرنا لازمی ہے۔

## ادویات کے استعمال سے متعلق ہدایات

### (الف)۔ عمل کریں

- ☆ ادویات صرف رجسٹرڈ ڈیلر سے خرید لیں۔
- ☆ لیبل پر بیچ نمبر، رجسٹریشن نمبر، ادویات بنانے / معیاد ختم ہونے کی تاریخ ضرور جانچ لیں۔
- ☆ ڈیلروں سے ادویات کی بل یا چالان ضرور حاصل کریں۔
- ☆ ادویات ذخیرہ کرنے کی جگہ کو راست دھوپ پڑنے اور بارش سے محفوظ رکھیں۔
- ☆ استعمال سے پہلے ادویات کی پیکنگ پر درج ہدایات کو ضرور پڑھیں۔
- ☆ ادویات کا سالویشن بنانے کے لئے ہمیشہ ضرورت

کے مطابق صاف پانی کا استعمال کریں۔

☆ ادویات چھڑکنے کے دوران پورے جسم کو حفاظتی لباس مثلاً دستانے، چہرے پر ماسک، اپرن وغیرہ سے ڈھک لیں۔

☆ چھڑکاؤ کے دوران ہمیشہ اپنی آنکھیں، ناک، کان اور ہاتھوں پر دوائی پھیلنے سے بچائیں۔

☆ ادویات کا استعمال سفارش کردہ مقدار کے مطابق کریں۔

☆ دواپاشی کے لئے مناسب ساز و سامان اور مشینری کا استعمال کریں۔

☆ صبح اور شام کے اوقات میں دواپاشی کریں۔

☆ چھڑکاؤ کے دوران تیار کردہ سالیوشن کو لگاتار ہلاتے رہیں۔

### (ب) گریز کریں

- ☆ دوائی کا سالویشن بنانے کے لئے گد لے اور مندے پانی کو استعمال میں نہ لائیں۔
- ☆ حفاظتی لباس پہنے بغیر نہ ہی دوائی تیار کریں اور نہ ہی دوائی کا چھڑکاؤ کریں۔
- ☆ پانی بھرنے اور چھڑکاؤ کرنے کے دوران دوائی کو انڈیلنے سے گریز کریں
- ☆ ادویات کا زائد یا کم شرح مقدار استعمال کرنے سے گریز کریں۔
- ☆ کھلے پھولوں کے دوران ادویات چھڑکنے سے گریز کریں۔
- ☆ گرمی کے موسم میں دن کے دوران دواپاشی سے

گریز کریں۔

☆ شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی کی طرف سے سفارش کردہ  
ادویات کے بغیر ایک سے زیادہ دوائیوں کو آپس  
میں ملانے سے گریز کریں۔

☆ ادویات کا سالیوشن بنانے اور ان کا چھڑکاؤ کرنے  
کے دوران کھانے، پینے وغیرہ سے گریز کریں۔

☆ دوائی کو اپنی اصلی پیکنگ سے دوسری پیکنگ میں  
منتقل نہ کریں۔

☆ دواپاشی کے لئے نقص زدہ ساز و سامان اور مشینری  
کا استعمال نہ کریں۔

☆ دوائی چھڑکنے کی پائپ اور نوزل کو منہ سے کھولنے  
اور صاف کرنے سے گریز کریں۔

کیمیائی کھادوں کا اوسط شرح استعمال  
(مقدار کھاد فی درخت سیب رناشپاتی رگلاس)

پوٹاش (گرام)	ڈے اے پی (گرام)	یوریا (گرام)	عمر سال
80	25	50	1
160	50	100	2
240	75	150	3
320	100	200	4
400	125	250	5
550	175	350	6
720	225	450	7
870	275	550	8
1000	325	650	9
1150	375	750	10
1450	450	900	11

1700	525	1050	12
1900	600	1200	13
2100	675	1350	14
2500	750	1500	15 & Above

### شرح مقدار کھا بایت فی درخت

#### اخروٹ

پوٹاش (گرام)	ڈے اے پی (گرام)	یوریا (گرام)	عمر سال
30	65	20	1
40	65	30	2
50	65	40	3
65	65	60	4
80	65	85	5
125	65	136	6
165	65	190	7
250	70	290	8



330	110	390	9
415	130	490	10
500	160	585	11
665	215	780	12
830	270	980	13
995	325	1175	14
995	435	1565	15
1245	540	1960	16
1995	650	2460	17
2025	760	2950	18
2155	975	3415	19
2400	1085	3915	20 on wards

## شرح مقدار كهاد باپت فى درخت

### بادام

پوٹاش (گرام)	ڈے اے پی (گرام)	یوریا (گرام)	عمر سال
60	25	60	1
120	50	120	2
180	75	180	3
240	100	240	4
300	125	300	5
420	175	420	6
540	225	540	7
660	275	660	8
780	325	780	9
900	375	900	10 onwards

### شرح مقدار کھاد باپت فی درخت انگور

پوٹاش (گرام)	ڈے اے پی (گرام)	یوریا (گرام)	عمر سال
100	75	120	1
200	150	250	2
300	200	400	3
500	350	800	4
800	500	1000	5 onwards

#### نوٹ:

آب پاشی والے میوہ باغات میں کیمیاوی کھادوں کی پہلی خوراک ڈی اے پی کی پوری مقدار اور ایم او پی (پوٹاش) و یوریا کی نصف مقدار فروری کے آخری ہفتے سے مارچ کے پہلے ہفتے کے دوران ڈال دیں جو کہ پھول آنے سے کم سے کم چار ہفتے پہلے زمین میں ڈالنی چاہئے۔ پھر ایم او پی

(پوٹاش) وپور یا کی باقی نصف مقدار جون کے پہلے دو  
ہفتوں میں ڈال دیں۔

غیر آب پاشی والے میوہ باغات میں کیمیاوی کھادوں کی  
پوری مقدار پہلے خوراک کے طور پر فروری کے آخری ہفتہ  
سے مارچ کے پہلے ہفتہ کے دوران ڈال دیں۔